



Koutzié

sur les papillons de Martinique



Sphinx du frangipanier
Pseudosphinx tetrio

Ce papillon de nuit, aux couleurs assez ternes et dont l'envergure peut atteindre 15 cm, appartient à la famille des Sphingidae. Il est essentiellement connu par sa chenille, qui est très colorée. Il n'est pas rare de l'observer sur les frangipaniers ou sur les allamandas et autres Apocynacées. Les couleurs aposématiques de la chenille ont pour but de prévenir les prédateurs de sa toxicité. L'adulte quant à lui est très discret et se confond très bien avec la végétation. Cette espèce est présente dans toute l'Amérique tropicale et subtropicale.



Castnia du père Pinchon
Castnia pinchoni

Bien que d'activité diurne, ce papillon de la famille des Castniidae est classé parmi les papillons de nuit. Il est présent en forêt hygrophile mais rarement observé. Il est endémique de la Martinique qui est la seule île des Petites Antilles à posséder une espèce de cette famille.



Papillon Chini-Tréf
Battus polydamas

Ce papillon diurne de la famille des Papilionidae est présent dans toute l'île. On peut le voir dans les jardins butiner les fleurs de bougainvilliers sans cesser de battre des ailes, à la manière des colibris. Il est surtout connu par sa chenille qui porte le nom créole de « chini-tréf ».



Heracles androgeus

Ce beau et grand papillon diurne, de la famille des Papilionidae, est d'observation récente à la Martinique (2011 au Morne Bigot) en provenance très probablement de Ste Lucie où il fait partie de la faune locale. Il semble s'être bien implanté puisqu'il a été aperçu récemment sur la Route de la Trace.



Piéride jaune
Phoebis sennae

Ce papillon diurne à large répartition (du sud des États-Unis à l'Argentine, y compris les Antilles) est un très bon volier qui peut effectuer des déplacements importants. En Martinique, il est présent partout, dans tous les milieux. Ses plantes hôtes appartiennent à la famille des Fabaceae (Senna, Cassia).

Honarque
Danaus plexippus

Bien connu par les migrations qu'il effectue chaque année de l'Amérique du Nord vers le Mexique pour y passer l'hiver. Ce papillon, de la famille des Nymphalidae est sédentaire dans les Antilles. Il fréquente les jardins et les savanes où pousse la plante nourricière de la chenille, *Asclepias curassavica* ou « Zèb a wat ».



Eriphioides dumbardoni

De la famille des Erebidae, ce petit papillon d'activité diurne, est cependant classé parmi les espèces nocturnes. Il n'est présent qu'en zone hygrophile et on peut même l'observer à des altitudes élevées comme au niveau de la caldeira de la Montagne Pelée. C'est une espèce endémique de l'île.

