

Koutzié

sur les crabes en Martinique

Crabe de terre

Cardisoma guanhumi

Les juvéniles sont rougeâtres. La couleur des adultes est variable selon l'habitat et l'alimentation (bleue, violette, etc.). Ce crabe terrestre dépend de l'eau pour sa respiration car ses branchies doivent être constamment humides. Il migre vers la mer pour sa reproduction. Après avoir porté les oeufs pendant une quinzaine de jours, la femelle les libère dans la mer pour l'éclosion et le développement des larves. Sa pêche, réglementée, est autorisée du 15 février au 15 juin et uniquement pour des individus de 7 cm de large minimum. Il est consommé en grande quantité durant les fêtes de Pâques et de Pentecôte, après une période de « purge » visant à le rendre propre à la consommation. Il est localement utilisé dans un plat appelé « Matoutou ».

Mantou

Ucides cordatus

Aussi appelé Crabe à barbe, à cause de ses pattes poilues, il est reconnaissable grâce à ses pattes violacées et sa carapace bosselée dont la couleur varie du jaune à l'ivoire. Il vit dans la vase humide de basse et de haute marée de la mangrove où il creuse un profond terrier pouvant atteindre 1 m. Il se nourrit de végétaux et de matière en décomposition (feuilles de palétuvier, fruits tombés au sol, etc.). Chaque année, il est pêché autour du mois de juin, période du « mariage des Mantous », durant laquelle de nombreux individus se regroupent pour la reproduction. C'est un crabe fragile subissant les pollutions et le réchauffement climatique.

Sé ma fot

Minuca rapax

Les mâles, plus gros que les femelles, possèdent une pince hypertrophiée qu'ils agitent comme s'ils faisaient leur « Mea culpa ». Ce geste vaut à l'espèce le nom « Sé ma fot » en créole. On l'appelle aussi Crabe violoniste car il a l'air de jouer d'un violon. Le Sé ma fot vit en colonie et affectionne la vase humide de la mangrove. En creusant des terriers, ces crabes participent à l'aération et l'oxygénation du sol, processus importants pour la mangrove.

Cirique de mer

Callinectes sapidus

Le Crabe bleu, appelé Cirique de mer aux Antilles, est un crabe principalement marin, d'estuaire et côtier. Il fréquente aussi les eaux douces et les eaux saumâtres (mares, marais, mangroves, etc.). Il a une grande facilité d'adaptation. Son alimentation très variée comprend des petits mollusques, des crustacés, des petits poissons ou encore des plantes. Il se sert de ses pattes arrière aplaties pour nager. Il est très consommé aux Antilles. Le nom « Cirique » est donné localement à un autre crabe : le Cirique de rivière. Les deux espèces se distinguent complètement. Elles appartiennent à une famille différente et possèdent une écologie et un mode de reproduction très distincts.

Crabe des palétuviers

Aratus pisonii

Petit crabe à la carapace presque carrée d'environ 2 cm de large, vivant en mangrove. Sa coloration va du brun au jaune tacheté. On le rencontre généralement sur les racines, le tronc et les branches des palétuviers. Il est présent le long des côtes américaines, du sud des États-Unis au Brésil, ainsi que dans le Golfe du Mexique et la Caraïbe. Il se nourrit principalement de feuilles de palétuviers. Il mange également des petits invertébrés, des matières mortes (feuilles, restes de poissons et d'autres crabes...). Il constitue un aliment de choix pour des poissons et des oiseaux.

