

Koutzié

sur les escargots en Martinique



*Pleurodonte
déprimé*
Discolepis desidens

Cet petit escargot, endémique de la Martinique, mesure environ 2 cm. Il est extrêmement rare et très fragile. Il n'est connu que d'une station dans le secteur de Fonds-Saint-Denis. C'est actuellement l'un des escargots les plus rares au monde.

Bulime multifascié
Antidrymaeus multifasciatus

Cet escargot mesure jusqu'à 3 cm. C'est une espèce endémique de Martinique et Guadeloupe. Rare et localisée dans notre île, elle est principalement présente au Nord. Il est caractérisé par une coquille fine très colorée, ornementée de bandes spirales blanches, noires, rouges et jaunes. Certains spécimens peuvent être quasiment jaunes ou blancs avec les bandes à peine perceptibles, notamment dans le Nord de l'île. Son corps est bleu clair, comme pour la plupart des espèces de ce genre.



Ambrette rougeâtre
Rhodonyx rubescens

Cet escargot à moeurs plutôt nocturnes, possède une coquille extrêmement fragile. Il est principalement observé sur les feuillages de la forêt hygrophile. La couleur de l'animal est jaune clair chez les juvéniles et devient ambrée chez l'adulte. Dans certaines zones d'altitude de l'île, il est pratiquement de couleur orange. Se nourrissant principalement la nuit, on l'observe encore le matin sur ou sous les feuilles de différentes plantes dont celles des balisiers. C'est un escargot endémique de la Martinique.



Achatine EEE
Lissachatina fulica

Escargot originaire d'Afrique, il fut introduit volontairement en Martinique en 1988. Depuis, il a colonisé toutes les communes de l'île. A tendance omnivore, il peut pondre jusqu'à 1200 oeufs par an. Cet escargot est considéré comme une espèce invasive, vectrice de parasites potentiellement dangereux. Il est également considéré dans certains pays comme une peste pour les végétaux.



Glandine de Rang
Laevaricella semitarum

Mesurant moins de 3 cm, la coquille de cet escargot carnivore est de forme allongée et brillante. Vivant dans la litière, il se nourrit principalement d'autres escargots. Comme d'autres molluscivores, il doit certainement chasser à l'odorat en suivant la piste du mucus de sa proie. Cette espèce peu commune s'observe essentiellement dans le nord de l'île jusqu'à une altitude de 1100 m. Il est endémique de la Martinique.

