



Koutzié

sur les papillons en Martinique



Sphinx du frangipanier

Pseudosphinx tetrio

Ce papillon de nuit, aux couleurs assez ternes et dont l'envergure peut atteindre 15 cm, appartient à la famille des Sphingidae. Il est essentiellement connu par sa chenille, qui est très colorée. Il n'est pas rare de l'observer sur les frangipaniers ou sur les allamandas et autres Apocynacées. Les couleurs aposématiques de la chenille ont pour but de prévenir les prédateurs de sa toxicité. L'adulte quant à lui est très discret et se confond très bien avec la végétation. Cette espèce est présente dans toute l'Amérique tropicale et subtropicale.



Castnia du père Pinchon

Castnia pinchon

Bien que d'activité diurne, ce papillon de la famille des Castniidae est classé parmi les papillons de nuit. Il est présent en forêt hygrophile mais rarement observé. Il est endémique de la Martinique qui est la seule île des Petites Antilles à posséder une espèce de cette famille.



Heracles androgeus

Ce beau et grand papillon diurne de la famille des Papilionidae a été observé pour la première fois en 2011 en Martinique (Morne Bigot, Trois-Ilets). Il provient probablement de Sainte-Lucie où il fait partie de la faune locale. Depuis, il semble bien implanté en Martinique puisqu'il a été aperçu sur la Route de la Trace et dans les hauteurs du Morne Obély (Case-Pilote).



Papillon Chini-Tréf

Battus polydamas cebriones

Ce papillon diurne de la famille des Papilionidae est présent dans toute l'île. On peut le voir dans les jardins butiner les fleurs de bougainvilliers sans cesser de battre des ailes, à la manière des colibris. Il est surtout connu par sa chenille qui porte le nom créole de « chini-tréf ».



Piéride jaune

Phoebis sennae sennae

Ce papillon diurne à large répartition (du sud des Etats-Unis à l'Argentine, y compris les Antilles) est un très bon voilier qui peut effectuer des déplacements importants. En Martinique, il est présent partout, dans tous les milieux. Ses plantes hôtes appartiennent à la famille des Fabaceae (Senna, Cassia).

Honarque

Danaus plexippus megalippe

Bien connu par les migrations qu'il effectue chaque année de l'Amérique du Nord vers le Mexique pour y passer l'hiver, ce papillon de la famille des Nymphalidae est sédentaire dans les Antilles. Il fréquente les jardins et les savanes où pousse la plante nourricière de la chenille, *Asclepias curassavica* ou « Zèb a wat ».



Eriphioides dumbardoni

Appartenant à la famille des Erebidæ, cette espèce de papillon est endémique strict de Martinique. Bien qu'il soit classé parmi les papillons nocturnes, il n'est pas rare de l'apercevoir de jour dans les forêts hygrophiles jusque dans les formations végétales d'altitude (Caldeira de la Montagne Pelée...).



Parc naturel régional de la Martinique



Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement



Suivez-nous

biodiversite-martinique.fr



Maison du Parc naturel régional de la Martinique

Morne Tartenson - BP 437 - 97205 Fort-de-France cedex 0596 64 42 59

Photos : P. COURTINARD, R. DELANNOYE, E. DUMBARDON-MARTIAL, E. POIRIER, D. ROME
texte : F. DEKNUYDT, relecture : PNRM, CBNMQ, E. DUMBARDON-MARTIAL