

Koutzié

sur les champignons en Martinique

Pleurotus djamor

Pleurotus djamor est présent dans de nombreuses régions du monde où sa taille et sa couleur varient. On l'observe dans les forêts humides et les zones boisées du littoral, notamment après la pluie. Comme chacune des espèces présentées ici, c'est un champignon saprotrophe : il joue un rôle essentiel en décomposant et recyclant le bois mort et la litière. Sa face supérieure est lisse, et sa face inférieure présente des lamelles fines et serrées, qui dégagent une odeur de farine. Aux Antilles, il est d'abord rose pâle, puis devient rapidement blanc, et il peut atteindre jusqu'à 6 cm à maturité.



Auricularia sp.

Le genre *Auricularia* est répandu dans le monde entier, avec cinq espèces connues à ce jour aux Antilles. Leur nom vient de leur forme d'oreille. Ils apparaissent tout au long de l'année en forêt sur les bois morts, seuls ou en groupe. Ils sont gélatineux, voire cartilagineux, parfois veloutés, et sans pied. Ils peuvent atteindre 10 cm de diamètre. On distingue les espèces par l'aspect (lisse / plissé, avec / sans poils...) et la couleur (crème, brun...).




Trametes maxima

Trametes maxima est largement répandu des Caraïbes jusqu'en Amérique du Sud. Ce champignon est bien représenté dans les écosystèmes forestiers hygrophiles et mésophiles de la Martinique, où il se développe sur les bois morts. Son chapeau, déployé en forme d'éventail, peut atteindre 30 cm. Sa face supérieure est blanche à jaune pâle et alterne des zones d'aspect laineux et des zones glabres. Sa face inférieure est blanchâtre, puis prend une teinte rousse en séchant. Elle présente des pores anguleux, dentés à maturité.



Cookeina speciosa

Les *Cookeina* sont principalement observés dans les forêts humides des régions tropicales. Poussant seuls ou en groupes, ils constituent un micro-habitat pour divers invertébrés. Atteignant 6 cm de haut et 4 cm de diamètre, ils sont solidement attachés aux bois sur lesquels ils se développent. Ils possèdent un chapeau en forme de coupe, souvent vivement coloré d'un rose orangé, parfois tout blanc. Sa face interne lisse contraste avec la face externe plus claire et couverte de fins poils.



Marasmes sp

Les marasmes sont des champignons, largement distribués dans les écosystèmes forestiers tropicaux et subtropicaux. Ils sont capables de reviviscence : ils sèchent quand l'humidité baisse, et peuvent reprendre leur apparence une fois réhydratés. Assez petits, leur chapeau dépasse rarement 3 cm de diamètre. Généralement assez neutres, du blanc/beige au brun clair à foncé, certains présentent des couleurs vives plus surprenantes (jaune, rose, rouge, pourpre...).



Favolus tessellatus

Favolus tessellatus est un champignon des forêts humides d'Amérique tropicale, fréquent en Martinique. Divers arthropodes y sont associés, et s'en servent comme abri et source de nourriture. Son chapeau mince se déploie en forme d'éventail ou de rein. Parfois lobé, il peut atteindre environ 12 cm de largeur. Sa face supérieure, de couleur crème à gris, est finement veloutée. Sa face inférieure est blanche à jaune pâle, et présente un réseau d'alvéoles en « nid d'abeilles ».

